Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
DRUG ALLERGY DELABELING 2026 BY EAACI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόρμα Αρχικής Καταγραφής Πιθανής Φαρμακευτικής Αλλεργίας

(Για συμπλήρωση από τον Ιατρό κατά το συμβάν)

Παραπομπή σε Παιδοαλλεργιολόγο για επιβεβαίωση / αποχαρακτηρισμό Φαρμακευτικής Αλλεργίας
3-6 μήνες μετά την αντίδραση με την κάτωθι φόρμα συμπληρωμένη

1. Στοιχεία Φαρμάκου (Ποιο;)

- Δραστική ουσία & Εμπορική ονομασία: _____
- Αιτία χορήγησης: (π.χ. Ωτίτιδα, Φαρυγγίτιδα με Strep test+/-) _____
- Δόση & Ημέρα θεραπείας: (π.χ. 3η δόση / 2η ημέρα) _____
- Είχε επαναχορηγηθεί η ίδια ουσία στο παρελθόν. ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Έλαβε μετά την αντίδραση αντίστοιχες ουσίες χωρίς αντίδραση ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]

2. Χρονική Συσχέτιση (Πότε;)

Χρόνος εμφάνισης από την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δόση:
- < 1 ώρα (Άμεση) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- 1 - 6 ώρες (Ενδιάμεση) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- > 6 ώρες (Επιβραδυνόμενη/Όψιμη) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]

Συνολική διάρκεια συμπτωμάτων: _____

3. Κλινική Εικόνα (Περιγραφή)

Τύπος εξανθήματος:
- Κνίδωση (Πομφοί, έντονος κνησμός, μετανευστικό εξάνθημα) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Κηλιδοβλατιδώδες (ιλαροειδές, σταθερό, χωρίς έντονο κνησμό) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Αγγειοοίδημα ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]

Συνοδά συμπτώματα (Red Flags):
- Δύσπνοια / Συριγμός / Βήχας ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Έμετοι / Διάρροια (αμέσως μετά τη λήψη) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Λιποθυμική τάση / Ωχρότητα ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Πυρετός (υψηλός κατά την εμφάνιση του εξανθήματος) ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Φυσαλίδες ή βλάβες στο στόμα/βλεννογόνους ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]
- Οίδημα αρθρώσεων / Αρθρίτιδα ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ]

4. Διαχείριση (Πλάνο)

- Χορηγήθηκε αγωγή; ΟΧΙ [ ], ΝΑΙ [ ] Αντιισταμινικό [ ] Κορτιζόνη [ ] Αδρεναλίνη [ ]
- Ανταπόκριση: Ταχεία [ ] Σταδιακή [ ] Καμία [ ]
- Φωτογραφία: Ελήφθη από τον ιατρό [ ] Ελήφθη από το γονέα [ ]

5. Εκτίμηση Κινδύνου

- Συνέβη τα τελευταία 5 έτη; (+2) ___
- Αναφυλαξία ή Αγγειοοίδημα; (+2) ___
- Χρειάστηκε επείγουσα θεραπεία; (+1) ___

ΣΥΝΟΛΟ: ____ (Σκορ < 2 = Χαμηλός κίνδυνος για νέα αντίδραση στη διαδιακασία delabeling)

Γιατί αυτή η φόρμα πληροφοριών βοηθά τον Παιδοαλλεργιολόγο;

Διαχωρίζει την IgE από την non-IgE: Ο χρόνος (<1 ώρα) είναι το "κλειδί" για την αναφυλαξία.
Αποκαλύπτει ιογενή εξανθήματα: Ο πυρετός μαζί με σταθερό εξάνθημα δείχνει συνήθως ίωση.
Τεκμηριώνει τη σοβαρότητα: Η χρήση αδρεναλίνης ή η συμμετοχή βλεννογόνων αλλάζει τελείως το πρωτόκολλο ελέγχου.